

CALCIUM BOVISAL

COMPENSA L'IPOCALCEMIA

L'ipocalcemia subclinica colpisce il 50% ca. delle vacche di terzo parto e più del 60% delle vacche dal quarto in poi. È immunodepressiva ed è alla base delle malattie del puerperio (metrite, chetosi, mastite). Per prevenirla sono indicate le diete anioniche in asciutta o il calcio orale dopo il parto.

Calcium Bovisal[®] è un gel di calcio ed energia. Contiene acetato e propionato di calcio che forniscono anche 3,1 MJ di energia by-pass. Due flaconi a cavallo del parto compensano efficacemente l'ipocalcemia e le sue gravi conseguenze. Il flacone anatomico e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

Modalità d'uso

Somministrare per via orale 1 flacone per capo secondo il seguente schema:

- 1 flacone il giorno prima del parto
- 1 flacone subito dopo il parto
- 1 flacone 12 ore dopo il parto
- 1 flacone 24 ore dopo il parto

Componenti

- Cloruro di magnesio
- Cloruro di sodio

Additivi tecnologici

- Calcio acetato (E263)
- Calcio propionato (E282)

Tenori analitici

- Umidità: 59,2%
- Proteine gregge: 0,1%
- Lipidi greggi: 0,0%
- Fibra grezza: 0,0%
- Ceneri gregge: 22,0%
- Calcio: 8,3%
- Magnesio: 0,12%
- Sodio: 0,1%

Potere energetico

3.1 MJ (740 kcal)
per 600 g

