

RODENTICIDA

1 - Composizione

100 g di Racumin SchiumAttiva contengono:

Cumatetralil puro (CAS 5836-29-3) 0,4062 g

Denatonium benzoato (Bitrex) 0,005 g

Isotridecanol, ethoxylated 1,800 g

Coformulanti, solventi e propellenti q. b. a 100 g

2 – Sostanza attiva

Cumatetralil (CAS 5836-29-3)

3 – Caratteristiche del prodotto

Rodenticida di contatto in schiuma. Per uso professionale.

Racumin SchiumAttiva è un rodenticida anticoagulante in una formula in schiuma che agisce per contatto; i roditori vengono in contatto con la schiuma lungo i loro percorsi imbrattandosi il manto; Racumin SchiumAttiva aderisce al mantello del roditore e viene successivamente assunta per ingestione.

Racumin SchiumAttiva è adatto per uso in condizioni di forte umidità, in caso di inefficacia delle esche tradizionali o di scarsa appetibilità da parte dei roditori.

Racumin SchiumAttiva non è un'esca e si utilizza prevalentemente come trattamento complementare all'interno di una strategia di lotta ai roditori: ottimizza e completa il piano di derattizzazione.

4 - Spettro d'azione

Per la lotta contro le infestazioni di Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Topolino domestico (*Mus musculus*)

5 - Aree di impiego

Racumin SchiumAttiva deve essere usato esclusivamente in zone interne, specialmente nei punti più difficili da trattare (cavità, condotti, intercapedini ed altre aree inaccessibili a bambini, animali domestici ed altre specie non target). Racumin SchiumAttiva si applica presso le tane, lungo i percorsi ed i possibili punti di passaggio dei roditori (es. fori, crepe dei muri, condotti, intorno a tubazioni, ecc.), mantenendo una distanza di almeno 2 metri da alimenti o mangimi e locali di deposito degli stessi.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

Racumin SchiumAttiva è pronto all'uso e facile da usare.

Prima del trattamento:

se necessario portare la confezione a temperatura ambiente. Agitare bene la confezione prima dell'utilizzo. Applicare l'apposita cannuccia alla confezione, posizionarla nel punto da trattare e premere il pulsante erogatore.

Evitare di applicare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati.

Dosi consigliate:

Racumin SchiumAttiva si applica alle seguenti dosi:

Ratto: applicare dai 20 ai 30 g di schiuma (per ogni tana/per ogni percorso*), corrispondente a circa 10 cm di schiuma

Topo: applicare da 4 a 30 g di schiuma (per ogni tana/per ogni percorso*), corrispondente a circa 6 cm di schiuma

* La dose indicata può essere anche suddivisa in diversi punti di applicazione rispettando la quantità complessiva.

Evitare di chiudere completamente i punti di passaggio dei roditori con la schiuma ma lasciare una piccola apertura visibile, in modo che i passaggi siano utilizzati comunque dai roditori.

Non applicare su superfici soggette a corrosione, prima dell'applicazione si consiglia di testare il prodotto su una piccola parte di superficie. La schiuma è un formulato a base acqua. Non applicare su parti elettriche scoperte o su cavi danneggiati dall'azione dei roditori. Pulire la schiuma applicata in eccesso utilizzando un panno o della carta. Dopo l'applicazione la valvola e la cannuccia possono essere pulite con acqua se necessario.

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso.

Dopo il trattamento:

La schiuma applicata ha una durata di 7/12 giorni a seconda delle condizioni ambientali.

Le attività di controllo di topi e ratti devono continuare finché non vi sia più consumo apparente delle esche e comunque non oltre le 6 settimane (il prodotto non è destinato ad un uso permanente).

La schiuma deteriorata deve essere rimossa ad ogni controllo. Effettuare operazioni di controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo la normativa vigente. Le carcasse non vanno gettate nei rifiuti o nelle discariche. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Quando il trattamento è terminato, tutta la schiuma rodenticida deve essere raccolta ed eliminata secondo le leggi vigenti.

7 - Registrazione

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2016/00342 MRS

8 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **PERICOLO**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H222 Aerosol altamente infiammabile. H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato. H319 Provoca grave irritazione oculare.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere /superfici riscaldate - Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 Proteggere gli occhi. P305 + P351 + P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

MECCANISMO D'AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti.

SINTOMI: a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un'inibizione massiva della vitamina K possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi.

TERAPIA: in caso di ingestione di quantità rilevanti di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. Se l'attività protrombinica risulta ridotta, somministrare vitamina K.

ANTIDOTO: vitamina K1. **CONTROINDICAZIONI:** anticoagulanti.

Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveneni.

In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua tiepida e sapone. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con gli occhi, togliere le lenti a contatto (se presenti) e sciacquare lentamente e dolcemente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte.

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

11 – Avvertenze

Questo prodotto deve essere utilizzato in circostanze eccezionali, se i metodi non chimici e le esche convenzionali risultano inefficaci. L'uso di guanti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto è obbligatoria. Per evitare residui negli alimenti o mangimi degli animali, quando si utilizza il biocida mantenere una distanza di almeno 2 m dai luoghi di conservazione degli alimenti e dei mangimi animali e dal luogo dove sono preparati o mangiati. Le zone trattate, all'interno dell'edificio, devono essere rese inaccessibili per impedire l'accesso dei bambini e degli animali domestici. Applicare in aree inaccessibili a bambini e animali domestici. Non contaminare alimenti, mangimi e bevande. Non utilizzare in agricoltura. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante. In caso di ingestione da parte di animali domestici o animali non bersaglio, rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrandogli il contenitore o

l'etichetta. Non riutilizzare la confezione vuota e non disperderla nell'ambiente ma eliminarla in conformità alle norme vigenti. Conservare la confezione ben chiusa e mantenere in luogo fresco e ben ventilato, inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare al riparo dal gelo. Non riutilizzare o ricaricare il contenitore.
PRODOTTO DESTINATO AL SOLO USO PROFESSIONALE

12 - Confezione

500 ml

13 – Compatibilità

Il prodotto può lasciare sulle superfici da trattare residui di colore blu. Rimuovere i residui con carta inumidita con acqua, raccogliere e smaltire secondo le leggi vigenti.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® Marchio registrato Gruppo Bayer